

Avertissements agricoles



GRANDES CULTURES



BULLETIN TECHNIQUE N°17 DU 20 JUIN 1990

BETTERAVES : pucerons : un dernier traitement si nécessaire
POIS : botrytis : tout début
tordeuses : petit vol
BLES : pucerons sur épis

BETTERAVES : pucerons

SITUATION : l'activité de la faune auxiliaire (prédateurs) semble avoir été freinée suite aux changements climatiques.

En effet, nous observons depuis 10 jours un développement parfois important des populations de pucerons noirs (*A. fabae*) sur betteraves.

Cette situation n'est pas généralisée : elle peut varier entre moins de 10 % et près de 100 % de pieds colonisés.

Les pucerons sont surtout installés dans le coeur des betteraves : bien dérouler les feuilles pour les observer.

PRECONISATION : même si cette année la végétation est avancée de plusieurs semaines, nous ne sommes que dans 2^{ème} quinzaine de juin et les pucerons peuvent contribuer fortement à dissiminer le virus à partir de betteraves déjà atteintes.

EN CAS D'INFESTATION = au moins 1 betterave / 10 colonisée
 Si le dernier traitement foliaire date de plus de 2 semaines, appliquer un dernier aphicide :

PRODUITS CONSEILLES	(Sumiméton	11 / ha
	(Sumiton	11 / ha
	(Métasystémox	1,51 / ha
	(Dipterex MR plus	1,81 / ha
	(Pirimor G	0,5 kg / ha

ou éventuellement un autre aphicide cité dans le tableau du bulletin n° 10.

Produits à ne pas utiliser : produits à base de parathion ou de diméthoate, et produits non homologués sur betterave.

7233



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F.
 SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION RÉGIONALE : - Avertissements Agricoles - Laboratoire
 rue Bernard Palissy B.P. 47-62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement
 annuel :
 à l'ordre
 Régisseur de Recettes
 D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais
 ISSN 0758-7988 - CPPAP n° 1865 AD

1ERS SYMPTOMES DE JAUNISSES OBSERVES : Des symptômes de jaunisse sont observés depuis quelques jours sur des betteraves isolées, sur les feuilles extérieures : ceci correspond aux toutes premières contaminations sur les premières feuilles formées.

Ces symptômes peuvent aussi être notés sur des parcelles ayant reçues une bonne protection aphicide : en effet il arrive qu'un puceron ait le temps de transmettre le virus avant même de mourir.

Ces inoculations primaires ne devraient pas donner naissance à de gros foyers si la dissémination a été bien contrôlée par les traitements. Elles seront donc sans incidence.

POIS PROTEAGINEUX

STADE : fin floraison, 2 étages de gousses pleines au minimum

MALADIES : Botrytis : les symptômes apparaissent peu à peu sur feuilles, fleurs passées et parfois jeunes gousses, mais fréquence encore faible.

TORDEUSES : en Flandre maritime, le vol est peu alimenté et plus faible que les 2 années précédentes pour le moment.

CAPTURES CUMULEES DEPUIS DEBUT PIEGEAGE PAR POSTE

Gravelines : 50	St Georges/A : 55
Nouv. Eglise : 10	Brouckerque : 30
Loon-Plage : 50	St Pierre Brouck : 135
Bourbourg : 38	Armbouts-Cappel : 29
	Quaedypre : 0

PRECONISATIONS : pas d'intervention insecticide anti-tordeuse pour le moment.

POIS DE CONSERVE

TORDEUSES : 1 traitement a été réalisé en Flandre Maritime dans le secteur à risque pour les premières dates de semis.

Pour les dates de semis plus tardives, attendre un avis de traitement, le vol étant stabilisé pour le moment.

Ne pas intervenir avant que le pois ait atteint le stade gousse plate pour le 2e étage.

BLES D'HIVER

STADE : en secteur tardif, les derniers SLEIPNER sont déflouris.

PUCERONS SUR EPIS : en progression sensible. Surveiller surtout les variétés tardives (APOLLO, SLEIPNER). Intervenir si nécessaire.

